## Telabilita El Desarrollo Típico de la Alimentación en los primeros 30 meses de la vida

## en los primeros 30 meses de la vida

Enhancing the lives of children with disabilities

Página 1 de 2

Edad 0-3 meses	Marcadores del Desarrollo  ► amamanta, traga y respira de manera reflexiva y rítmica	Típo de <u>Comida</u> leche, líquidos	Cantidad 2-6 onzas/comida 6+ comidas/día	Método pecho, biberón
4-6 meses	<ul> <li>▶ la acción de chupar reemplaza la de amamantar</li> <li>▶ empieza a desarrollar la acción de masticar</li> <li>▶ puede empezar a tomar por vaso</li> </ul>	leche, líquidos, purés	9-10 onzas/comida 4-6 comidas/día	pecho, biberón cucharita
7-9 meses	<ul> <li>▶ cierra más seguro la boca</li> <li>▶ mastica la comida suave</li> <li>▶ come con los dedos</li> <li>▶ toma por vaso</li> <li>▶ pone jugetes en la boca</li> <li>▶ empieza mover la lengua de lado a lado (la lateralización)</li> </ul>	leche, líquidos, purés, cereal de bebé	11+ onzas/comida 4-6 comidas/día	biberón, vaso, cucharita
10-12 meses	<ul> <li>▶ mastica de manera controlada</li> <li>▶ abre la boca de manera graduada</li> <li>▶ mueve la comida del area central hacia los lados de la boca</li> <li>▶ agarra en la forma de pinza y come con las manos de manera más precisa</li> </ul>	todos mencionados arriba + la comida molida o machucada	11+ onzas/comida 4-6 comidas/día	biberón, vaso, cucharita

## TelAbility

Enhancing the lives of children with disabilities

Página 2 de 2

<u>Edad</u>	Marcadores del Desarrollo	Típo de <u>Comida</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Método</u>
12-15 meses	<ul> <li>▶ la lateralización de la boca más refinada</li> <li>▶ usa la lengua para limpiar los labios</li> <li>▶ lleva una cucharita llena a su boca</li> </ul>	todos mencionado arriba + la comida finamente picada		
15-18 meses	<ul> <li>▶ mastica con la boca cerrada</li> <li>▶ utiliza los dientes de arriba para limpiar el labio de abajo</li> <li>▶ se alimenta solo pero haciendo revoltijo</li> </ul>	todos mencionado arriba + la comida de mesa		vaso, cucharita, tenedor
24-30 meses	<ul> <li>▶ el babeo está disminuido o ausente</li> <li>▶ come bién con una cucharita</li> <li>▶ mastica utilizando un movimiento rotativo de la quijada</li> </ul>			

Escrito por: Joshua J. Alexander, MD

Para más información comuniquese con el autor: pdrehab@med.unc.edu

Traducido por: Shervl Belshaw-Ponciano

Última Revisión: 7/01/01

## Referencias and Recurses (disponibles a través de la Librería de TelAbility):

- •Stevenson, RD y Allaire, JH (1996). Developmental pre-feeding checklist: A global approach. En Sullivan y Rosenbloom *Feeding the disabled child*, MacKeith Press, London.
- •Eicher, P(1998). Nutrition and Feeding. En *Caring for children with cerebral palsy*, Dorman y Pellegrino, Eds., Brookes Publishing Company, Baltimore, Maryland.
- •Walter, RS (1994). Issues Surrounding the Development of Feeding and Swallowing. En *Disorders of feeding and swallowing in infants and children*, Singular Publishing, San Diego, California.
- •Jepsen, Cy Nickel, RE (2000). Nutrition and Growth. En *The physician's Guide to Caring for Children with Disabilities and Chronic Conditions*, página 82, Brooks Publishing Company, Baltimore, Maryland.